

Министерство здравоохранения Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации ФГБОУ ВО РязГМУ Минздрава России

Утверждено решением ученого совета Протокол № 10 от 20.05.2025 г.

Комплект оценочных	«ОП.01. Анатомия и физиология человека»				
материалов по дисциплине	«Оп.от. инатомия и физионогия ченовека»				
	Основная профессиональная образовательная				
Образовательная программа	программа - программа подготовки специалистов				
Ооразовательная программа	среднего звена по специальности				
	31.02.03. Лабораторная диагностика				
Квалификация	Медицинский лабораторный техник				
Форма обучения	Очная				

Разработчик (и): кафедра анатомии

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
	ученое звание	1	
Павлов А.В.	д-р мед. наук, проф.	ФГБОУ ВО РязГМУ	Заведующий
		Минздрава России	кафедрой
Линник Т.А.	канд. сх. наук	ФГБОУ ВО РязГМУ	Старший
		Минздрава России	преподаватель
			кафедры
Овчинникова Н.В.	канд. мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ	Доцент кафедры
		Минздрава России	

Рецензент (ы):

ФИО	Ученая степень, ученое звание	Место работы (организация)	Должность
Черданцева Т.М.	д-р мед. наук, проф.	ФГБОУ ВО РязГМУ	Заведующая
		Минздрава России	кафедрой
			гистологии,
			патологической
			анатомии и
			медицинской
			генетики
Бирченко Н.С.	канд. мед. наук, доц.	ФГБОУ ВО РязГМУ	Доцент кафедры
		Минздрава России	нормальной
			физиологии с
			курсом
			психофизиологии

Одобрено учебно-методической комиссией по программам среднего профессионального образования, бакалавриата и довузовской подготовки Протокол № 9 от 21.04. 2025 г.

Одобрено учебно-методическим советом.

Протокол № 5 от 24.04.2025г.

1. Паспорт комплекта оценочных материалов

- 1.1. Комплект оценочных материалов (далее КОМ) предназначен для оценки планируемых результатов освоения рабочей программы дисциплины (модуля). Анатомия и физиология человека.
- 1.2. КОМ включает задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Общее количество заданий и распределение заданий по типам и компетенциям:

Код и наименование	Количество заданий	Количество заданий
компетенции	закрытого типа	открытого типа
OK – 1-9	40	20
ПК – 1.1	20	20
ПК – 1.3	20	20
$\Pi K - 1.4, \Pi K - 1.5$	20	20
ЛР - 1	20	20
Итого	120	100

- 1.3. Дополнительные материалы и оборудование для выполнения заданий (при необходимости):
 - 1. Скелет и наборы костей.
- 2. Фантомы внутренних органов (сердце, головной мозг разборный, желудок, мышцы конечностей, печень, почки, брюшная полость с органами, легкие, гортань, трахея и главные бронхи и др.)
 - 3. Влажные препараты из архива кафедры.
 - 4. Баночные препараты из музея кафедры анатомии.
 - 5. Отпрепарированные комплексы внутренних органов.
 - 6. Кадаверы.

2. Задания всех типов, позволяющие осуществлять оценку всех компетенций, установленных рабочей программой дисциплины OП.01 Анатомия и физиология человека

Код и наименование	№	Формулировка заданий
компетенции	п/п	(по типам с инструкциями)
		Задания закрытого типа
	1.	
ОК-1		Установите правильную последовательность передачи нервного импульсапо рефлекторной дуге.
Выбирать способы		
решения задач		А. вставочный нейрон
профессиональной		Б. рецептор
деятельности		В. эффекторный нейрон
применительно к		Г. сенсорный нейрон
различным контекстам		Д. рабочий орган
	2.	Установите правильную последовательность мер оказания первой медицинской
ОК-2		помощи утопающему.
Использовать		1) ритмично надавливать на спину, чтобы удалить воду из дыхательных путей
современные средства		2) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
поиска, анализа и		3) положить пострадавшего вниз лицом на бедро согнутой в колене ноги спасателя
интерпретации		4) сделать искусственное дыхание изо рта в рот, зажав нос
информации и		5) очистить полости носа и рта пострадавшего от грязи и тины
информационные	3.	Установите последовательность процессов при чихании.
технологии для		1) передача нервных импульсов в продолговатый мозг
выполнения задач		2) резкий выдох через нос
профессиональной		3) поступление импульсов к диафрагме и межреберным мышцам
деятельности		4) глубокий резкий вдох
		5) раздражение рецепторов носовой полости
ОК-3 Планировать и		
реализовывать	4.	Установите правильную последовательность расположения кровеносных сосудов в
собственное		порядке увеличения скорости движения крови в них.
профессиональное и		1) артериолы пальцев верхней конечности
личностное развитие,		2) капилляры

Деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК-4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК-6 Проявлять ОК-6 Проявлять 4) нижняя полая вена 5) аорта 5. Установите правильную последовательность пассажа желчи. 1) нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 2) желчный пузырь 3) карман Гартмана 4) общий желчный проток 5) общий печёночный проток 6 7 Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8 Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) оссудиетый клубочек		2)
Профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 1. нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 2. желчный пузырь 3. карман Гартмана 4. общий желчный проток 5. общий печёночный проток	предпринимательскую	3) плечевая артерия
сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. ОК-4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языкс Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК-6 Проявлять ОК-6 Проявлять 5. Установите правильную последовательность пассажа желчи. 1) инсходящая часть двенадцатиперстной кишки 2) желчный пузырь 3) карман Гартмана 4) общий желчный проток 5) общий печёночный проток 7) Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8) Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек		
5. Установите правильную последовательность пассажа желчи.	1 1	5) аорта
1 нисходящая часть двенадцатиперстной кишки 2 желчный пузырь 3 карман Гартмана 4 общий желчный проток 5 общий печёночный проток 6 Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области 1 m.gluteus maximus 2 m.obturatorius exterrnus 3 mm.gemelli 4 m.tensor fasciae latae 5 m.qudratus femoris 5 m.qudratus femoris 7 Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1 m.soleus 2 m.gastrocnemius 2 m.gastrocnemius 3 m.plantaris 5 m.plantar	1 1 '	
2 желуный пузырь 3 карман Гартмана 4 общий желуный проток 5 общий печёночный проток 5 общий келучной области 5 общ	-	
Ситуациях. 3) карман Гартмана ОК-4 Эффективно 4) общий желчный проток взаимодействовать и работать в коллективе и команде 6. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 0K-6 Проявлять 3) карман Гартмана 4) oбщий желчный проток 5 общий печёночный проток 6. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области 1) m.gluteus maximus 2 m.gudratus femoris 5 m.qudratus femoris 1 m.soleus 2 m.gastrocnemius 2 m.gastrocnemius 3 m.plantaris 3 m.plantaris 5 m.plantaris 5 m.plantaris 8 Vстановите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 0K-6 Проявлять 1) сосудистый клубочек	-	•
ОК-4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 6. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени ОК-6 Проявлять 4) общий желчный проток 5) общий печёночный проток 5) общий печёночный проток 6. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области 1) m.gluteus maximus 2) m.obturatorius exterrnus 3) mm.gemelli 4) m.tensor fasciae latae 5) m.qudratus femoris 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	различных жизненных	
ОК-4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 5) общий печёночный проток ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области 1) m.gluteus maximus 2) m.obturatorius exterrnus 3) mm.gemelli 4) m.tensor fasciae latae 5) m.qudratus femoris 5) m.qudratus femoris 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 5) m.plantaris 4) тейстров нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	ситуациях.	/ 1
взаимодействовать и работать в коллективе и команде 6. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме ОК-6 Проявлять 1) сосудистый клубочек		
работать в коллективе и команде ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста ОК-6 Проявлять 1) m.gluteus maximus 2) m.obturatorius exterrnus 3) mm.gemelli 4) m.tensor fasciae latae 5) m.qudratus femoris 7. Vстановите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Vстановите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	* *	5) общий печёночный проток
команде 2) m.obturatorius exterrnus ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме ОК-6 Проявлять 1) сосудистый клубочек	взаимодействовать и	6. Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области
ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 2) m.plantaris 3) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	работать в коллективе и	1) m.gluteus maximus
OK-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 2) m.plantaris 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме ОК-6 Проявлять 1) сосудистый клубочек	команде	2) m.obturatorius exterrnus
устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantarisОК-6 ПроявлятьУстановите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек		3) mm.gemelli
коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 1) m.soleus ОК-6 Проявлять 7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени 1) m.soleus 2) m.gastrocnemius 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	ОК-5 Осуществлять	4) m.tensor fasciae latae
государственном языке 1) m.soleus Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) coсудистый клубочек	устную и письменную	5) m.qudratus femoris
государственном языке 1) m.soleus Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	коммуникацию на	7. Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени
учетом особенностей социального и культурного контекста 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	государственном языке	
учетом особенностей социального и культурного контекста 3) m.plantaris 4) m.flexor digitorum longus 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	Российской Федерации с	2) m.gastrocnemius
культурного контекста 5) m.plantaris 8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	учетом особенностей	, e
8. Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме 1) сосудистый клубочек	социального и	4) m.flexor digitorum longus
0К-6 Проявлять 1) сосудистый клубочек	культурного контекста	5) m.plantaris
0К-6 Проявлять 1) сосудистый клубочек		
	ОК-6 Проявлять	
гражданско- 2) петля Генле	гражданско-	2) петля Генле
патриотическую 3) дистальный извитой каналец	патриотическую	
позицию, 4) капсула клубочка	позицию,	
демонстрировать 5) проксимальный извитой каналец	демонстрировать	
осознанное поведение 9. Установите правильную последовательность черепных нервов.	осознанное поведение	
на основе традиционных 1) языкоглоточный	на основе традиционных	
общечеловеческих 2) блуждающий	общечеловеческих	
ценностей, в том числе с 3) отводящий	ценностей, в том числе с	

учетом гармонизации	4) лице	вой							
межнациональных и	5) глазодвигательный								
межрелигиозных	1 Установите последовательность циркуляции спинномозговой жидкости								
отношений, применять	1) отве	рстие Монро							
стандарты	2) четв	ертый желуд	очек						
антикоррупционного	3) отве	рстие Мажан	ди						
поведения	4) трет	ий желудочег	κ						
	 5) суба 	рахноидальн	ое простран	ство					
	11 Задание: в	ыберите и п	оставьте в	таблицу цифр	ы правильны	ых ответов, установив			
ОК-7 Содействовать	соответств	вие между ос	обенностям	ии позвонков ј	различных от	гделов и названиями			
сохранению	особенн	ости позвонн	ков различн	ых отделов	позвонки				
окружающей среды,	A) Coct	оит из 4-5 ма	леньких нед	цоразвитых					
ресурсосбережению,	позвонк	ЮВ							
применять знания об	б) Имеют отверстия в поперечных отростках								
изменении климата,	для про	для прохождения позвоночнойартерии							
принципы бережливого	в) Имен	в) Имеют на телах и поперечных отростках							
производства,	полуямки для сочленения сребрами								
эффективно действовать	г) 5 сросшихся мощных позвонков в единую кость								
в чрезвычайных									
ситуациях									
0.74 0.77	 крес 	тец							
ОК-8 Использовать	2) шейные позвонки								
средства физической	3) грудные позвонки								
культуры для	4) копчик Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:								
сохранения и									
укрепления здоровья в	A	Б	В	Γ					
процессе	1 1			-					
профессиональной									

деятельности и Задание: выберите и подставьте в таблицу цифры правильных ответов, установив соответствие поддержания между характером изгибов и отделами позвоночника необходимого уровня А.физиологический лордоз Б.физиологический кифоз физической подготовленности. 1. шейный 2. грудной ОК-9 Пользоваться 3. крестцовый профессиональной 4. поясничный документацией на Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: государственном и A Б иностранном языках. Соотнесите отделы мозга и выполняемые функции. функции Отделы мозга 1. Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные 2. Мозжечок движения, контролирует 3. Средний мозг процессы научения, приобретения 4. Промежуточный мозг навыков. 5. Конечный мозг б) регулирует дыхание и сердцебиение, содержит центры кашля и рвоты в) контролирует работу эндокринных железг) координирует движения

	те выоранные і	цифры под соотв	етствующ	ими буквами:	
A	Б	В	Γ	Д	
Опреде.	лите гормоны	, характерные д	ля различ	иных желез.	
	1.Гипофи			сулин;	
	2.Щитови	идная железа	б) сог роста	иатотропин (гор);	МОН
	3. Надпоч			оксин;	
	5.Половы	удочная железа е железы	д) адј	тостерон; реналин;	
Запишит	те выбранные і	цифры под соотв	етствующ	ими буквами:	
A	Б	В	Γ	Д	

				T .	1	
	3.	тонкая кишка	a	В) желчные	е кислоты	
	4.	. толстая кишка		Г) продукция муцина		
	Запишите вы	ібранные циф	ры под соотв	етствующими	буквами:	
	A	Б	В	Γ		
1 4						
'	Опрелелите	основные мі	ышны слелун	ощих частей	скелета.	
	- T. 200	Область		мышца		
		1. плечевой	пояс	А) квадратн	ный пронатор	
		2. предплеч	ье		нная мышца	
		3. голень		В) большая круглая мышца		
		4. стопа		Г) червеобразная мышца		
	Запишите вы А	выбранные цифры под соо		етствующими Г	т буквами:]	
-						
ᆜ						
,	Определите	функционалы	ную роль отде	елов нефрона		
1		отдел		функция		
		1. Мальпиги	ево тельце	А) реабсорбция мочевины		
		2. проксима	льный	Б) реабсорбция глюкозы,		
		извитой к		аминокисло		
		3. Петля Генле		В) образование первичной мочи		
		3. Hellin I ch	ле	– Б) ооразова	nine nepbh mon mo m	ı
		 Дистальн 		_	бция воды, секреция	
				_	_	
	Запишите вь	4. Дистальн каналец	ый извитой	Г) реабсорб	бция воды, секреция	

A	Б	В	Γ			
18 Определ	ите место прик	пеппения наиз	ПО MLIIIIILI			
Попредел	nie meeto npnk	репления на ч	ила мышцы			
	мышца		Куда г	ірикрепляется		
	1. портняж		· ·	вной бугорок лопатки		
				ной трети ключицы,		
	3. локтевая	·		края оости лопатки		
	4. дельтови	дная мышца		ный надмыщелок		
			плечевой ко			
				верхняя ость		
Запишит	подвздошной кости подвздошной кости не выбранные цифры под соответствующими буквами:					
	Б	В	<u>Γ</u>]		
A	D	D	1			
19 Определ	ите место прик	репления нача	ала мышцы			
	нерв	<u></u>	ядро	1. 1		
	1. n. abd 2. n.faci		A) n. nervi a Б) n. ambigu			
		ssopharyngeus	B) nn.vestib			
		tibulocochlearis				
Запишит	е выбранные цис					
A	Б	В	Γ]		
21 Опрадал	20 Определите топографию ядра черепного нерва					
20 Определ	πτο τοποι ραφιπ		or o mepau			

		 n. nervi ab n. solivator n. ambigue n. vestibule 	rius superior ous ocochlearis	Б) дорсалы области соl В) в area ve Г) в област блуждающ	•	
	A	Б	В	Γ		
	Задания закр	ытого типа				
1.	1) 1 2) 1 3) 3 4) 6	правильную вставочный не рецептор эффекторный сенсорный не рабочий орган	ейрон нейрон йрон	льность пер	едачи нервного импулі	ьсапо рефлекторной дуге.
2.	помощи утог 1) д 2) д 3) д 4) о	пающему. ритмично над доставить пос положить пос сделать искус	авливать на с традавшего в традавшего в ственное дых	спину, чтобы в медицинско низ лицом на кание изо рта	оказания первой меди удалить воду из дыхате: е учреждение в бедро согнутой в колен в рот, зажав нос шего от грязи и тины	тьных путей
5) очистить полости носа и рта пострадавшего от грязи и тины Установите последовательность процессов при чихании. 1) передача нервных импульсов в продолговатый мозг 2) резкий выдох через нос 3) поступление импульсов к диафрагме и межреберным мышцам						

	4) глубокий резкий вдох
	5) раздражение рецепторов носовой полости
	Установите правильную последовательность расположения кровеносных сосудов в
	порядке увеличения скорости движения крови в них.
	1) артериолы пальцев верхней конечности
4.	2) капилляры
	3) плечевая артерия
	4) нижняя полая вена
	5) аорта
	Установите правильную последовательность пассажа желчи.
	1) нисходящая часть двенадцатиперстной кишки
5.	2) желчный пузырь
	3) карман Гартмана
	4) общий желчный проток
	5) общий печёночный проток
	Установите последовательность мышц в слоях ягодичной области
	1) m.gluteus maximus
6.	2) m.obturatorius exterrnus
	3) mm.gemelli
	4) m.tensor fasciae latae
	5) m.qudratus femoris
	Установите последовательность положения мышц в слоях задней области голени
	1) m.soleus
7.	2) m.gastrocnemius
	3) m.plantaris
	4) m.flexor digitorum longus
	5) m.plantaris
8.	Установите последовательность отделов нефрона в почечной паренхиме
<u> </u>	6) сосудистый клубочек

7) петля Генле	
8) дистальный извитой каналец	
9) капсула клубочка	
10)проксимальный извитой каналец	
Установите правильную последовательность черепных нервов.	
1) языкоглоточный	
9. 2) блуждающий	
3) отводящий	
4) лицевой	
5) глазодвигательный	
Установите последовательность циркуляции спинномозговой жидкости	
1) отверстие Монро	
10 2) четвертый желудочек	
3) отверстие Мажанди	
4) третий желудочек	
5) субарахноидальное пространство	
Задание: выберите и поставьте в таблицу цифры правильных ответов, устан	новив
соответствие между особенностями позвонков различных отделов и названи	ІЯМИ
особенности позвонков различных отделов позвонки	
А) Состоит из 4-5 маленьких недоразвитых	
позвонков	
б) Имеют отверстия в поперечных отростках для	
прохождения позвоночной артерии	
в) Имеют на телах и поперечных отростках	
полуямки для сочленения сребрами	
г) 5 сросшихся мощных позвонков в единую кость	
1) крестец	
2) шейные позвонки	
3) грудные позвонки	
4) копчик	

	Задание: выберите и подставьте в таблицу цифры правильных ответов, установив между характером изгибов и отделами позвоночника А.физиологический лордоз Б.физиологический кифоз 1) шейный 2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б Соотнесите отделы мозга и выполняемые функции.		A	Б	В	Γ				
между характером изгибов и отделами позвоночника А.физиологический лордоз Б.физиологический кифоз 1) шейный 2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:	между характером изгибов и отделами позвоночника А.физиологический лордоз Б.физиологический кифоз 1) шейный 2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б Соотнесите отделы мозга и выполняемые функции.									
А.физиологический лордоз Б.физиологический кифоз 1) шейный 2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:	1) шейный 2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: А Б Соотнесите отделы мозга и выполняемые функции.		Задание: выберите и подставьте в таблицу цифры правильных ответов, установив сомежду характером изгибов и отделами позвоночника							
2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:	2) грудной 3) крестцовый 4) поясничный Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами: ———————————————————————————————————							і кифоз		
		3		2) гру 3) кре 4) поя выбранные ци	дной стцовый сничный	тствующим	и буквами:			
Отделы мозга функции							-			
1) Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные				,			1 1			
1) Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные 2) Мозжечок движения, контролирует	2) Мозжечок движения, контролирует	13				_	научения, приооретения			
1) Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные 2) Мозжечок движения, контролирует процессы научения, приобретения	2) Мозжечок движения, контролирует процессы научения, приобретения				-		ууст лыхание и			
1) Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные движения, контролирует процессы научения, приобретения навыков.	2) Мозжечок движения, контролирует процессы научения, приобретения навыков.			ij Rone in	.D.II 1910-01	/	. •			
1) Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные движения, контролирует процессы научения, приобретения навыков. 4) Конечный мозг б) регулирует дыхание и	2) Мозжечок 3. Средний мозг 3) Промежуточный мозг 4) Конечный мозг б) регулирует дыхание и					* ' ' '				
1) Продолговатый мозг 2) Мозжечок 3. Средний мозг 3) Промежуточный мозг 4) Конечный мозг 5 регулирует дыхание и сердцебиение, содержит центры	2) Мозжечок 3. Средний мозг 3) Промежуточный мозг 4) Конечный мозг сердцебиение, содержит центры					_				
1) Продолговатый мозг а) отвечает за произвольные движения, контролирует процессы научения, приобретения навыков. 4) Конечный мозг б) регулирует дыхание и	2) Мозжечок 3. Средний мозг 3) Промежуточный мозг 4) Конечный мозг сердцебиение, содержит центры кашля и рвоты					работу				

	Запишите	выбранные циф	ры под соотве	обработ слуховой ин	ет гвляет первич ку зрител нформации	іную ьной и		
	A	Б	В	Γ	Д			
1	4	1.Гипофиз 2.Щитовидна 3. Надпочечн 4.Поджелудо 5.Половые ж	ая железа ники очная железа елезы	а) инсули б) сомато роста); в) тироко г) тестост д) адрена	ин; отропин (горм син; перон; олин;	ЮН		
	А	выбранные циф Б	вы под соотве	Г	д			
1	5 Определи	ите ведущие фа	кторы для со	ответствующ	цей анатомич	еского обј	разования	

	<u> </u>				1	
		Анатомическ	toe	Ведуп	цие факторы	
		образование				
		1. ротоглотк	a	А) перистал		
		2. пищевод			класса IgA	
		3. тонкая ки	шка	В) желчные	е кислоты	
		4. толстая к	ишка	Г) продукц	ия муцина	
	Запишите вы	лбранные циф	п ы пол соотв	-тствующими	г буквами:	
		T	•	·	1	
	A	Б	В	Γ		
	Определите	основные мн	ышцы следун	ощих частей	скелета.	
		Область		мышц		
		1. плечев	вой пояс		ный пронатор	
		2. предпл	печье	Б) подошве	нная мышца	
		3. голень	•	В) большая	круглая мышца	
10		4. стопа		Г) червеобр	разная мышца	
	Запишите вы	ибранные циф	ры под соотв	етствующими	буквами:	
			•	·	, 1	
	A	Б	В	Γ		
		1	1	ı		
	Определите	функциональн	ную роль отде	елов нефрона		
		отдел	-	функц	рия при	
17	7	1. Мальп	игиево тельце		оция мочевины	
		2. прокси			оция глюкозы,	
			ой каналец	аминокисло		
		3. Петля	·		ние первичной мочи	
	L				1	

		4. Дистал извито	пьный ой каналец	Г) реабсорб мочевины	оция воды, секреция	
	Запишите	выбранные циф	ры под соотве	і тствующими	буквами:	
	A	Б	В	Γ		
					-	
	Определи	те место прикр	епления нача	ла мышцы		
				IC		
		мышца			прикрепляется	
		· •	ажная мышца	,	вной бугорок лопатки	
		, ,	вая мышца	,	ной трети ключицы,	
		плеча			края оости лопатки	
18		,	вая мышца		ный надмыщелок	
		, , ,	видная	плечевой ко		
		мышца	a		верхняя ость	
				подвздошно		
	Запишите	выбранные циф	ры под соотве	тствующими	буквами:	
	A	Б	В	Γ		
					_	
19		те место прикр	епления нача	лла мышцы		
		нерв		ядро]

			2) n.facialis 3) n.		S	guus bulares torius superior
		Запишите вы	бранные цифј	ры под соотве	тствующими	и буквами:
		A	Б	В	Γ	
		Определите	топографию	ядра черепно	ого нерва	
	20		ядро		Топога	рафия ядра
		-		i abducens	A) formation	
			2) n. soliv		· /	ная часть моста в
			superio		· •	liculus facialis
			3) n. ambi			stibularis моста
			,	_	/	и треугольника
			4) II. VCSII	bulococificalis	блуждающе	
		2077777777777	5	ры под соотве		•
		Запишите вы	оранные цифј	ры под соотве	тствующими	т буквами.
		A	Б	В	Γ	
ОК-1		Задания закр	ытого типа			
Выбирать способы				еды входят сл	едующие жи	идкости:
решения задач профессиональной деятельности применительно к	1.	1) крог 2) изот 3) плаз	В состав внутренней среды входят следующие жидкости: 1) кровь, лимфа, межклеточная жидкость; 2) изотонический раствор; 3) плазма крови; 4) пищеварительные соки.			
различным контекстам		•				

		F
OK 2		Гомеостаз – это:
ОК-2		1) разрушение эритроцитов;
Использовать	2.	2) соотношение плазмы крови и форменных элементов;
современные средства		3) образование тромба;
поиска, анализа и		4) постоянство показателей внутренней среды.
интерпретации		
информации и		К функциям крови не относится:
информационные	_	1) трофическая;
технологии для	3.	2) защитная;
выполнения задач		3) синтез гормонов;
профессиональной		4) дыхательная.
деятельности		Количество крови в организме:
		1) $6 - 8\%$ от веса тела;
ОК-3 Планировать и	4.	2) 1 – 2 % от веса тела;
реализовывать		3) 8 – 10 литров;
собственное		4) 1 – 2 литра.
профессиональное и		Основными органами депо крови являются:
личностное развитие,		1) кости, связки;
предпринимательскую	5.	2) печень, кожа, селезенка;
деятельность в		3) сердце, лимфатическая система;
профессиональной		4) центральная нервная система.
сфере, использовать		В состав гистогематического барьера входит:
знания по финансовой		
грамотности в	6.	1) только ядро клетки;
различных жизненных	0.	2) только митохондрии клетки;
^		3) мембрана митохондрий и включений;
ситуациях.		4) мембрана клетки и сосудистая стенка.
OV 4 Daharana		Относительное, динамическое постоянство внутренней среды называется:
ОК-4 Эффективно взаимодействовать и	7.	1) гемолизом;
· ·	/•	2) гемостазом;
работать в коллективе и		3) гомеостазом;
команде		4) гемотрансфузией.

		R coctor ruythauuau chanu ua rvongt chanuloulua wuutkootu.
ОК-5 Осуществлять		В состав внутренней среды не входят следующие жидкости:
	8.	1) кровь;
устную и письменную	0.	2) лимфа;
коммуникацию на		3) межклеточная жидкость;
государственном языке		4) пищеварительные соки.
Российской Федерации с		Количество белков в плазме крови равно:
учетом особенностей	0	1) $2-3\%$;
социального и	9.	2) 8 – 10 %;
культурного контекста		3) $6-8\%$;
		4) 10 – 15 %.
ОК-6 Проявлять		Изотонический раствор – это раствор содержащий:
гражданско-		1) определенное количество эритроцитов;
патриотическую	10	2) количество солей, соответствующее плазме крови;
позицию,	10	3) количество питательных веществ, соответствующее плазме крови;
демонстрировать		4) определеное количество белков плазмы крови.
осознанное поведение		
на основе традиционных		1Гемолизом называется:
общечеловеческих		12) разрушением эритроцитов;
ценностей, в том числе с	11	2) Зразрушением лейкоцитов;
учетом гармонизации		3) о1бразованием тромба;
межнациональных и		4) соотношением плазмы и форменных элементов.
межрелигиозных		Алкалоз – это:
отношений, применять		1) сдвиг реакции крови в кислую сторону;
стандарты	12	
антикоррупционного		3) изменение осмотического давления;
поведения		4) изменение онкотического давления.
поредения		
		Количество минеральных веществ в плазме крови равно:
ОК-7 Содействовать	13	1) 8 – 10 %;
сохранению	13	2) 0 0 70,
окружающей среды,		3) 0,8 - 1 %;
окружающей среды,		4) $0.1 - 0.3 \%$.

ресурсосбережению,		Ацидоз это:
применять знания об	1 1	1) сдвиг реакции крови в кислую сторону;
изменении климата,	14	2) edin peakin kpobi b inche in yle cropony,
принципы бережливого		3) изменение осмотического давления;
производства,		4) изменение онкотического давление.
эффективно действовать		Вязкость крови – это взаимодействие:
в чрезвычайных		1) эритроцитов с солями плазмы;
ситуациях	15	2) KILLOK KOODH II OCIKOD MCKAY COOCH,
		3) клеток сосудистого эндотелия;
ОК-8 Использовать		4) кислот и оснований в плазме крови.
средства физической		Белки плазмы крови не выполняют функцию:
культуры для		1) защитную;
сохранения и	16	2) трофическую;
укрепления здоровья в		3) транспорт газов;
процессе		4) пластическую.
профессиональной		Физиологический раствор это:
деятельности и		1) 0,9 % NaCl;
поддержания	17	2) 10 % NaCl;
необходимого уровня		3) 6 % NaCl;
физической		4) 0,9 % KCl.
подготовленности.		В состав внутренней среды входят следующие жидкости:
		1) кровь, лимфа, межклеточная жидкость;
OM O FI	18	2) изотонический раствор;
ОК-9 Пользоваться		3) плазма крови;
профессиональной		4) пищеварительные соки.
документацией на		К функциям крови не относится:
государственном и	19	1) трофическая;
иностранном языках.		2) защитная;
		3) синтез гормонов;
		4) дыхательная.
	20	Гомеостаз – это:

1	
	1) разрушение эритроцитов;
	2) соотношение плазмы крови и форменных элементов;
	3) образование тромба;
	4) постоянство показателей внутренней среды.
	Задания открытого типа
1.	(акая группа крови у больного, если агглютинация его эритроцитов произошла в стандартных сыворотках 0 (I), A (II) и В (III) групп?
2.	У больного моча имеет цвет пива, что обусловлено присутствием большого количества билирубина. С чем может быть связано увеличение количества этого пигмента в моче?
3.	акие группы крови можно перелить больному, если агглютинация его эритроцитов произошла в стандартной сыворотке 0 (I) и В (III) групп?
4.	Кровь отца Rh ⁺ , матери Rh ⁻ . Первая беременность. Существует ли опасность Rh- конфликта матери и плода, если плод имеет Rh ⁺ кровь?
5.	Диспетчер аэропорта, бывший лётчик, 55 лет, возвратившись, домой после работы, внезапно почувствовал сильную давящую боль в области сердца, слабость, одышку. Приём валидола и нитроглицерина боль не уменьшил. Прибывший по телефонному вызову, фельдшер станции скорой помощи после осмотра больного ввёл ему 1 мл 1% раствора морфина, внутримышечно 1 мл 1% раствора димедрола и на носилках госпитализировал его в стационар. Какое заболевание заподозрил фельдшер станции скорой помощи у данного больного?
6.	У человека в холодную погоду наблюдается резкое побледнение кожных покровов. В жаркое время года, наоборот, имеет место гиперемия кожных покровов, особенно, в области лица. Как изменяется просвет кожных сосудов у человека в условиях воздействия низкой и высокой температур окружающей среды? С какой функцией кожных сосудов связано это явление?
7.	Известно, что при одной и той же температуре воздуха человек быстрее зябнет в слякотную погоду, чем в сухую. Объясните этот факт с позиции терморегуляции. Назовите основные способы теплоотдачи.
8.	У ребёнка со сниженным поступлением витамина D с пищевыми продуктами и недостаточным пребыванием на воздухе при солнечном свете стали наблюдаться судороги мышц, и появилась деформация костей нижних конечностей. Объясните причину появления судорог мышц и деформации костей.
9.	Официантка кафе, 22 года, через 10 дней после внебольничного аборта почувствовала общее недомогание,

	боль внизу живота, повышение температуры тела. Одновременно обнаружила гнойно-кровянистые выделения из матки. При исследовании отмечается болезненность матки, увеличение и мягковатая её консистенция. В крови — лейкоцитоз со сдвигом влево, увеличение СОЭ до 40мм/ч. Что может быть у больной и какие осложнения возможны при отсутствии лечения и неблагоприятных условиях?
10.	Какой гормон оказывает следующие эффекты: влияние на рост, участвует в реакциях адаптации при наличии стресса, участвует в формировании иммунокомпетентных органов?
11.	Под влиянием, какого гормона осуществляются: синтез гликогена в печени и мышцах; интенсивное окисление глюкозы в тканях; уменьшение количества сахара в крови; и снижение катаболизма белка?
12.	При каком заболевании основными симптомами являются следующие нарушения обмена: гипергликемия, глюкозурия, кетонурия, ожирение печени и повышение распада белка, ацидоз.
13.	Больной не может согнуть руку в локтевом суставе. Какой нерв поражён? Из какого он сплетения?
14.	Человек при ходьбе волочит за собой ногу. Какой нерв поражён?
15.	У пациента затруднён акт вдоха. Какие нервы поражены?
16.	У больного нарушена кожная чувствительность в затылочной области головы. Какие нервы повреждены?
17.	Пациент предъявляет жалобу на болезненность кожи в области шеи поражение, какого нерва вы подозреваете?
18.	Больному трудно разогнуть (выпрямить) спину. Повреждение, каких нервов можно подозревать?
19.	Больному после травмы трудно сделать пронацию (поворот внутрь) кисти. Повреждение, какого нерва Вы можете предположить?
20.	У больного после перелома плечевой кости в области хирургической шейки и наложения гипса, рука не отводится до горизонтального уровня. Какой нерв поражён? Какая мышца не сокращается?
	Практические задания
1.	Напишите зубные формулы молочных и постоянных зубов.

2.	Покажите и назовите границы зева.
3.	Покажите и назовите положение миндалин лимфо-эпителиального кольца Пирогова-Вальдейера.
4.	Покажите места открытия протоков слюнных желез в ротовой полости.
5.	Покажите сообщения глотки.
6.	Покажите части желудка.
7.	Покажите части тонкой кишки.
8.	Покажите части тонкой кишки.
9.	Зарисуйте схему дольки печени.
10	Зарисуйте схему слоев миокарда.
11	Покажите большой и малый сальники, брыжейки тонкой и поперечной ободочной кишки.
12	Зарисуйте схему проводящей системы сердца.
13	Зарисуйте схему нефрона.
14	Покажите хрящи гортани.
15	Покажите части гортани на схеме.
16	Расскажите и покажите элементы корня легкого в воротах.
17	Покажите границы легкого и плевры.
18	Зарисуйте схему ацинуса.
19	Зарисуйте схему путей желчеоттока от печени.
20	Покажите части и сужения и расширения мужского мочеиспускательного канала.
21	Покажите предстательную железу и семенные пузырьки.
22	Покажите части матки, маточных труб, яичники.
23	Покажите мышцы промежности.

	24.	Зарисуйте схему рефлекторной соматической дуги.
	25.	Зарисуйте схему серого вещества спинного мозга.
ПК-1.1. Проводить		Задания закрытого типа
физико-химические		Структурно-функциональной единицей почек является:
исследования и владеть		1) ацинус;
техникой лабораторных	1	2) мицелла;
работ		3) нефрон;
		4) нейрон.
		Юкстагломерулярный аппарат почки – это:
		1) треугольник, образованный стенками приносящей и выносящей артериол и клетками дистальных
	2.	канальцев;
	۷.	2) треугольник, образованный стенками приносящей и выносящей артериол и клетками проксимальных
		канальцев; 3) треугольник, образованный клетками проксимальных и дистальных канальцев;
		4) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды.
		Концентрирование и разведение мочи происходит в:
	3.	1) капсуле Боумена – Шимлянского;
		2) петлях Генле и собирательных трубочках;
		3) только в собирательных трубочках нефронов;
		4) только в проксимальных канальцах нефронов.
		. Реабсорбция в почках – это:
	4.	1) процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови в капсулу Боумена – Шумлянского;
		2) процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови в почечные канальцы;
		3) процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови в петлю;
		4) процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев в кровь.
		При потреблении мясной пищи диурез уменьшается, так как:
	5.	1) повышается гидростатическое давление крови;
		2) повышается онкотическое давление крови;
		3) понижается ОЦК;
		4) угнетается секреция АДГ.
	6.	В петлях Генле нефронов концентрирование и разведение мочи достигается за счет:
		1) реабсорбции натрия в нисходящем колене и воды в восходящем колене;

2) реабсорбции воды в нисходящей и натрия в восходящей части петли; 4) секреция воды и мочевины в обеих частях петли. Секреция, один из процессов мочеобразования, происходит: 1) в капсулах Боумена — Шумлянского пефронов; 7. 2) из крови в поченные канальщы нефронов; 3) из крови в петли Генле нефронов; 4) из дистальных канальшев нефронов в кровь. Поворотно-противоточная система в нефронах — это: 1) проксимальные канальщы и петля Генле; 8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов, 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие регии-аштиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках; 11. 2) сужение сосудов и уменьшение фильтрации в почках;	T		
4) секреции воды и мочевины в обеих частях петли. Секреция, один из процессов мочеобразования, происходит: 1) в капсулах Боумена – Шумлянского нефронов; 7. 2) из крови в почечные канальцы нефронов; 3) из крови в петли Генле нефронов; 4) из дистальных канальцев нефронов в кровь. Поворотно-противоточная система в нефронах – это: 1) проксимальные канальцы и петля Генле; 8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов, Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена – Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			2) реабсорбции глюкозы и аминокислот;
Секреция, один из процессов мочеобразования, происходит: 1) в капсулах Боумена – Шумлянского нефронов; 7. 2) из крови в почечные канальцы нефронов; 3) из крови в петли Генле нефронов; 4) из дистальных канальцев нефронов в кровь. Поворотно-противоточная система в нефронах – это: 1) проксимальные канальцы и петля Генле; 8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена – Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбщией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбщей; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
пефронов; 2 из крови в почечные канальцы нефронов; 3 из крови в петли Генле нефронов; 4 из дистальных канальцев нефронов в кровь.			
7. 2) из крови в почечные канальцы нефронов; 3) из крови в петли Генле нефронов; 4) из дистальных канальцев нефронов в кровь. Поворотно-противоточная система в нефронах — это: 1) проксимальные канальцы и петля Генле; 8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			Секреция, один из процессов мочеобразования, происходит: 1) в капсулах Боумена – Шумлянского
3) из крови в петли Генле нефронов; 4) из дистальных канальцев нефронов в кровь. Поворотно-противоточная система в нефронах — это: 1) проксимальные канальцы и петля Генле; 8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтращией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтращией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			нефронов;
3) из крови в петли Генле нефронов; 4) из дистальных канальцев нефронов в кровь. Поворотно-противоточная система в нефронах — это: 1) проксимальные канальцы и петля Генле; 8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтращией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтращией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;		7.	2) из крови в почечные канальцы нефронов;
Поворотно-противоточная система в нефронах – это: 1) проксимальные канальцы и петля Генле; 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена – Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
1) проксимальные канальцы и петля Генле; 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			4) из дистальных канальцев нефронов в кровь.
1) проксимальные канальцы и петля Генле; 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			Поворотно-противоточная система в нефронах – это:
8. 2) петля Генле, собирательные трубочки и оплетающие их сосуды; 3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
3) дистальные канальцы нефронов; 4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;		8.	
4) проксимальные канальцы нефронов. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из крови капилляров в капсулу Боумена — Шумлянского нефрона называется: 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
1 синтезом; 2 секрецией; 3 реабсорбцией; 4 фильтрацией. 1 синтезом; 2 секрецией; 3 реабсорбцией; 4 фильтрацией. 1 процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1 синтезом; 10. 2 секрецией; 3 реабсорбцией; 4 фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1 расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			/ 1
9. 1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			*
3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;		9.	
4) фильтрацией. Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
Процесс перехода воды и растворенных в ней веществ из канальцев нефрона в кровь называется: 1) синтезом; 10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
1) синтезом; 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
10. 2) секрецией; 3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
3) реабсорбцией; 4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;		10	
4) фильтрацией. Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;		10.	
Действие ренин-ангиотензиновой системы направлено на: 1) расширение сосудов и усиление фильтрации в почках;			
почках;	-		/ .
[11. [2] Сужение сосудов и уменьшение фильтрации в почках;		11.	,
3) синтез эритропоэтинов и активацию кроветворения;			
4) распад гемоглобина и образование уробилина.	-		
12. В нефронах почек фильтрируются:		12.	11 1 1 1 1
1) форменные элементы крови;			1) форменные элементы крови;

Г	1	
		2) крупномолекулярные белки плазмы;
		3) только метаболиты;
		4) низкомолекулярные компоненты плазмы и воды.
		Обязательная реабсорбция в почках – это процесс перехода воды и всех ценных для организма веществ,
		происходящий: 1) в проксимальных канальцах нефрона;
	13.	2) из крови в почечные канальцы;
	13.	3) из крови в петлю Генле;
		4) в капсуле Боумена – Шумлянского.
		Почечный клиренс (очищение) инулина – это метод оценки: 1) почечного кровотока;
	14.	2) канальцевой секреции;
	14.	3) клубочковой фильтрации;
		4) канальцевой реабсорбции.
		В канальцах нефронов полностью реабсорбируются:
		1) аминокислоты и глюкоза;
	15.	2) мочевина и креатинин;
	13.	3) красители и рентгенконтрастные вещества;
		4) высокомолекулярные вещества.
		Факультативная реабсорбция в почках – это процесс, происходящий:
		1) в проксимальных канальцах нефрона;
	16.	2) из крови в почечные канальцы;
	10.	3) из крови в петлю Генле;
		4) в дистальных канальцах нефрона.
		. В почках секретируются:
	17.	1) глюкоза и аминокислоты;
		2) витамины и вода;
		3) белки и соли;
		4) ионы калия и лекарственные вещества.

		Гормон альдостерон выделяется в кровь при:
		1) снижении концентрации натрия в плазме и уменьшении ОЦК;
1	18.	2) повышении концентрации натрия в плазме и увеличении ОЦК;
		3) повышении концентрации ионов Н в плазме и снижении рН;
		4) накоплении молочной кислоты и развитии ацидоза.
		Основными факторами, влияющими на скорость фильтрации в нефронах, являются:
		1) гидростатическое давление, онкотическое давление крови, внутрипочечное давление;
1	19.	2) осмотическое давление, рН крови;
		3) только внутрипочечное давление и онкотическое давление крови;
		4) парциальное давление газов.
		В состав первичной мочи не входит:
		1) мочевина;
2	20	2) эритроциты;
		3) витамины;
		4) аминокислоты
		Задания открытого типа
	1.	При каком заболевании основными симптомами являются следующие нарушения обмена: гипергликемия,
		глюкозурия, кетонурия, ожирение печени и повышение распада белка, ацидоз.
	2.	Какой гормон оказывает следующие эффекты: влияние на рост, участвует в реакциях адаптации при наличии
		стресса, участвует в формировании иммунокомпетентных органов?
	3	При надавливании в области подколенной ямки и позади медиальной лодыжки у больного появляется резкая
		боль. Какой нерв даёт эти боли?
4	4.	Ребёнок заболел эпидемическим паротитом (инфекционное заболевание околоушной слюнной железы),
		которой осложнился гнойником этой области. Хирург разрезом вскрыл гнойник. После выздоровления у
		ребёнка на этой половине лица возникла анемия (маскообразность) лица. Повреждение, какого нерва можно
		заподозрить?
	5	У больного заболел зуб на верхней (нижней) челюсти. Раздражение, каких нервов Вы можете предположить?
	6	У пациента наблюдается расстройство вкусовой чувствительности языка. Поражение, каких нервов Вы
		предполагаете?
	7	У больного возникло отвисание нижней челюсти из-за слабости атрофии жевательных мышц. Поражение,
		какого нерва Вы предполагаете?

Т		
	8	Пациент не может поднять брови, зажмурить глаза, надуть щёки. Повреждение, какой пары черепных нервов можно заподозрить? Повреждение, какой пары черепных нервов можно заподозрить?
		повреждение, какон пары черенных первов можно заподозрить:
	9	У больного наблюдается приступ бронхиальной астмы вследствие сужения бронхов. Усиление, какого нерва Вы предполагаете?
	10	У пациента соринка попала под нижнее веко, вызвав боль и слёзотечение. Функциями, каких нервов можно объяснить данные симптомы?
	11	Пациент жалуется на быструю утомляемость, шаткую походку. При обследовании обнаружены пониженный тонус мышц (гипотония), асинергия и интенционный тремор – дрожание костей, усиливающееся при целенаправленных движениях. Функция какой структуры мозга нарушена?
	12	На медосмотре находился пациент 25 лет, который жалуется на увеличение размеров кистей рук. При осмотре обнаружено увеличение не только кистей, но и стоп, носа и нижней челюсти. Нарушение гормональной функции какой жизненно важной железы могло повлечь описанные изменение пропорций тела пациента? Как называется данное состояние?
	13	Спортсмен-лыжник, 25 лет, на следующий день после тренировки на лыжах в морозную ветреную погоду почувствовал озноб и сильные боли в мошонке слева, которые иррадиировали в паховую область. К вечеру температура тела повысилась до 38.5°C. При осмотре мошонка с левой стороны отёчна, гиперемирована. При пальпации придаток левого яичка увеличен, напряжён, уплотнён, болезнен. Придаток как обруч охватывает яичко. Поверхность яичка гладкая, консистенция равномерная, плотноэластическая. В крови — лейкоцитоз (11000 лейкоцитов в 1мкл), повышение СОЭ (до 20 мм/ч). Ваш предварительный диагноз.
	14	Продавец киоска, женщина, 25 лет, через несколько дней после сильного переохлаждения почувствовала общую слабость, повышение температуры тела, тяжесть внизу живота, учащённое болезненное мочеиспускание с болью в конце его. При осмотре моча мутная с неприятным запахом и примесью крови. Ваше мнение о предполагаемом диагнозе?
	15	Кондитер столовой со стажем работы 15 лет, женщина, 45 лет, рост 165 см, большая любительница сладких и мучных блюд, в последние 2 года стала отмечать отложение жира в подкожной клетчатке преимущественно на животе, груди, шее, спине, в области таза, также одышку, быструю утомляемость, боли в области сердца.

	1	
		При росте 165 см в течение последних 2 лет масса тела увеличилась от 65 кг до 82 кг. Ваше мнение о
		предполагаемом диагнозе и возможных последствиях этого заболевания.
	16	Температура воздуха +38°C. На пляже борются с перегреванием разными способами: один лежит,
		свернувшись калачиком, другой находится в воде при той же температуре, третий завернулся в мокрую
		простыню, четвёртый стоит. Какой способ наиболее эффективный?
	17	Почему человек находящийся на морозе в состоянии алкогольного опьянения, особенно подвержен угрозе
		замерзания?
	18	Спортсмен-лыжник, 25 лет, на следующий день после тренировки на лыжах в морозную ветреную погоду
		почувствовал озноб и сильные боли в мошонке слева, которые иррадиировали в паховую область. К вечеру
		температура тела повысилась до 38.5°C. При осмотре мошонка с левой стороны отёчна, гиперемирована. При
		пальпации придаток левого яичка увеличен, напряжён, уплотнён, болезнен. Придаток как обруч охватывает
		яичко. Поверхность яичка гладкая, консистенция равномерная, плотноэластическая. В крови – лейкоцитоз
		(11000 лейкоцитов в 1мкл), повышение СОЭ (до 20 мм/ч). Ваш предварительный диагноз.
	19	Бывший инженер-конструктор, пенсионер, 65 лет, большую часть времени на работе вёл сидячий образ
		жизни. 2 года назад без видимой причины стал отмечать незначительное нарушение акта мочеиспускания,
		неприятные ощущения внизу живота и промежности. Затем появились: учащённое мочеиспускание сначала
		ночью, а затем и днём, повелительные позывы на мочеиспускание без болей, приводящие к неудержанию
		мочи. Однако вскоре эти симптомы сменились неполной хронической задержкой мочи, а потом –
		задержанием мочи с её неудержанием (парадоксальная ишурия). Какое широко распространённое
		заболевание имеется у данного больного?
	20	Какой крупный нерв плечевого сплетения был повреждён у больного при переломе плечевой кости в средней
		трети, если при этом у него нарушилась иннервация мышц-разгибателей предплечья, кисти и пальцев,
		вследствие чего у него сформировалась «свисающая» кисть?
		Задания закрытого типа
	1.	Висцеральная боль возникает при раздражении:
ПК-1.3. Организовывать		1) суставов;
деятельность		2) мышц;
	•	· ·

находящегося в		3) внутренних органов;
распоряжении		4) кожи.
медицинского персонала		
	2.	К светопроводящим элементам глаза не относится:
		1) зрачок;
		2) хрусталик;
		3) сетчатка;
		4) роговица.
	3.	Изображение может исчезнуть, если оно попадает на:
		1) слепое пятно;
		2) желтое пятно;
		3) центральную ямку;
		4) рецепторы сетчатки.
	4.	Рецепторы слуха находятся в:
		1) полукружных каналах;
		2) буграх четверохолмия;
		3) кортиевом органе;
		4) височной доле коры.
	5.	Болевые рецепторы – это:
		1) тельца Мейснера;
		2) колбы Краузе;
		3) свободные нервные окончания;
		4) тельца Руффини
	6.	Наиболее чувствительная часть языка к сладкому вкусу – это:
		1) корень;
		2) боковая часть;
		3) кончик;
		4) центральная часть.
	7.	Безусловные рефлексы:
		1) требуют обучения;
		2) изменчивые;

		3) индивидуальные;
		4) видовые.
8	8	Внутреннее торможение в коре возникает в результате:
		1) действия посторонних раздражителей;
		2) ослабления условного раздражителя;
		3) уменьшения силы безусловного раздражителя;
		4) прекращения подкрепления безусловного раздражителя условным.
9	9.	В основе кратковременной памяти лежат:
		1) электрофизиологические процессы;
		2) биохимические реакции синтеза новых молекул белка;
		3) структурные изменения в центральных синапсах;
		4) гормональные влияния.
1	10.	Первая сигнальная система характеризует реакции человека на:
		1) смысловое значение слова;
		2) смысл печатного текста;
		3) зашифрованную информацию (азбуку Морзе, глухонемых);
		4) реальные раздражители.
1	11.	В основе биологических мотиваций лежит: 1) стремление к знаниям; 2) стремление к общению; 3)
		преданность религии; 4) сомато-висцеральная потребность.
1	12.	Условные рефлексы – они:
		1) врожденные;
		2) видовые;
		3) постоянные;
		4) индивидуальные.
1		Внешнее корковое торможение:
		1) уточняет условные рефлексы;
		2) переключает поведение на более важный раздражитель; 3) растормаживает условные рефлексы;
		4) усиливает ответную реакцию.
1		Структурная фиксация следа в коре лежит в основе:
		1) образования условных рефлексов;

	2)
	2) иконической памяти;
	3) кратковременной памяти;
	4) долговременной памяти.
14.	Социальная мотивация – это:
	1) чувство жажды;
	2) чувство голода;
	3) чувство холода;
	4) увлечение музыкой.
15.	10. Безусловные рефлексы и инстинкты направлены на:
	1) сохранение вида;
	2) изменение вида;
	3) индивидуальное приспособление;
	4) индивидуальное развитие.
16.	Внутреннее условное торможение:
	1) концентрирует внимание на новом раздражителе;
	2) предохраняет нервные центры от истощения;
	3) усиливает ответную реакцию;
	4) уточняет, конкретизирует условные рефлексы
17.	Количество крови в организме:
	1) 6 - 8 % от веса тела;
	(2) 1 - 2 % от веса тела;
	3) 8 - 10 литров;
	4) 1 - 2 литра.
18.	5. Основными органами депо крови являются:
	1) кости, связки;
	2) печень, кожа, селезенка;
	3) сердце, лимфатическая система;
	4) центральная нервная система.
19.	В состав гистогематического барьера входит:
	1) только ядро клетки;
	2) только митохондрии клетки;
•	

1	
	3) мембрана митохондрий и включений;
	4) мембрана клетки и сосудистая стенка.
20.	В состав внутренней среды не входят следующие жидкости: 1) кровь;
	2) лимфа;
	3) межклеточная жидкость;
	4) пищеварительные соки.
	Задания открытого типа
1.	Женщина-домохозяйка, 40 лет, 2 месяца назад перенесла операцию – удаление части щитовидной железы в связи с диффузным токсическим зобом (базедовой болезнью). Однако после операции выздоровления не почувствовала, а на оборот отмечала слабость, вялость, сонливость, заторможенность, ухудшение памяти.
	На лице и конечностях появилась отёчность, имеющая своеобразный характер (при надавливании пальцем ямки не остаётся). Температура тела постоянна снижена. Отмечается также брадикардия, глухость сердечных тонов, тенденция к снижению АД. В крови выявляется гипохромная анемия, повышение содержания холестерина. Поглощение радиоактивного йода (I ¹³¹) щитовидной железой снижено. Основной обмен понижен на 40%. Ваше мнение о предполагаемом диагнозе.
2.	Актриса одного из московских театров, 46 лет, после перенесённого на ногах гриппа стала отмечать сухость во рту, жажду, обильное и частое мочеиспускание, прогрессирующее похудание не смотря на повышенный аппетит. По-прежнему продолжали беспокоить общая слабость и понижение работоспособности. Вскоре у неё появились на коже множественные гнойнички, сопровождаемые мучительным кожным зудом. О каком заболевании нужно подумать в данном случае, и какие анализы следует сделать для уточнения диагноза?
3.	Какой крупный нерв плечевого сплетения был повреждён у больного при переломе плечевой кости в средней трети, если при этом у него нарушилась иннервация мышц-разгибателей предплечья, кисти и пальцев, вследствие чего у него сформировалась «свисающая» кисть?
4.	Два одноклассника Коля и Миша, 11 лет, во время катания зимой с крутой горки на санках перевернулись и получили травмы: Коля — обширную поверхностную ссадину в области правого коленного сустава и голени, а Миша — глубокую ушиблено-рваную рану размером 2 х 0,5 см. в области возвышения большого пальца левой кисти. Как, по Вашему мнению, произойдёт регенерация и заживление мягких тканей у обоих школьников?

5.	Студент медицинского института, 20 лет, после перенесённого на ногах острого респираторного заболевания стал отмечать боли в области левой икроножной мышцы голени с отдачей в пяточное сухожилие. Боли тупого характера наблюдались как в покое, так и при ходьбе. Позднее появилась повышенная чувствительность (гиперестезия) в области поражённой мышцы и болезненные уплотнения, меняющие при надавливании пальцами свою форму. Какое заболевание следует предположить у данного больного?
6.	Дежурная медицинская сестра терапевтического отделения, 20 лет, получила из хирургического отделения больницы для переливания две ампулы с кровью первой группы и поместила их на временное хранение в морозильную камеру холодильника. Какую ошибку допустила дежурная медицинская сестра и к каким негативным последствиям она может привести?
7.	льному с AB (IV) группой перелито более 3 л крови 0 (I) группы. После переливания крови у него появилась желтуха и резко возросла концентрация связанного билирубина в крови. Почему?
8.	В больницу поступил больной с острой кровопотерей, объём которой составил более 0,5л. Группа крови больного A (II) Rh ⁻ . В распоряжении врача имеются ампулы со следующими группами крови: 0 (I) Rh ⁻ , A (II) Rh-, A (II) Rh ⁺ . Какую кровь необходимо перелить больному?
9.	Женщина — пенсионерка, 67 лет, спускаясь по ступенькам лестницы метро станции «Бабушкинская», оступилась и упала на область большого вертела бедренной кости. При осмотре дежурным врачом в приёмном отделении больная отмечает боль в области правого тазобедренного сустава, нога ротирована (повёрнута) кнаружи, укорочена. Больная не может поднять вытянутую ногу (симптом прилипшей пятки), пассивные движения в тазобедренном суставе резко болезненны, и ограничены, отмечаются отёк и гематома в области тазобедренного сустава. Ваше мнение о диагнозе и лечении.
10	Студент института физической культуры, 22 года, во время выполнения прыжка в длину резко подвернул кнаружи правую голень при согнутом коленном суставе. Вскоре после этого появились локализованная боль по линии суставной щели с медиальной стороны, резкое ограничение движений в правом коленном суставе, особенно разгибания, наличие гемартроза (кровоизлияние в сустав). На следующий день наступила блокада коленного сустава в вынужденном фиксированном положении под углом 140-160*. Ваш предполагаемый диагноз и что следует сделать для уточнения диагноза?

1	. Секретарь-машинистка, 25 лет, последние 10 дней работала с большой нагрузкой на кисти рук, печатая на простой машинке. Два дня назад почувствовала боль на тыле правой кисти, одновременно заметив припухлость в этой области по ходу сухожилий. Движения II- III — IV пальцев правой кисти ограничены и болезненны. Во время движения пальцев отчётливо определяется крепитация (хруст, скрип). Ваш предполагаемый диагноз?
1	Рабочий-паркетчик, 35 лет, со стажем работы 10 лет, выполняет свою работу в основном на коленях. В течение последних 2 лет отмечает в области коленной чашечки (надколенника) слева округлую ограниченную припухлость, мягкой консистенции. Кожа над ней подвижна, не изменена. Функция конечности не нарушена. Однако в последние 3 дня припухлость заметно увеличилась, стала болезненной, флюктуирующей из-за скопления в ней жидкости. Какое заболевание имеется у данного больного?
1	Ребёнок, 5 лет, грызя семечки, случайно заглотил одно из них в дыхательные пути. Вскоре после этого у него появились приступы кашля и удушья. Затем состояние несколько стабилизировалось, но приступы кашля и удушья изредка повторялись. Через какой главный бронх, по Вашему мнению, попало инородное тело в дыхательные пути ребёнка и, какая анатомическая особенность способствовала этому?
1	Многорожавшая женщина, 40 лет, мать шестерых детей, в течение последних 5 лет отмечает наличие на подкожных венах обеих ног утолщений (узлов) разной величины, отёки нижних конечностей к вечеру, ощущение распирания при длительном стоянии, судороги в икроножных мышцах в конце дня, а иногда и по ночам, парестезии. Отёки после ночного отдыха полностью исчезают. При осмотре на внутренней поверхности обеих голеней по ходу подкожных вен видны утолщения (узлы) разной величины, кожа на внутренней поверхности нижней трети голеней пигментирована и уплотнена. О каком заболевании нужно подумать в данном случае?
1	

	16.	Человек съел бутерброд с маслом. Проследите, как будут изменяться принятые продукты по ходу продвижения их по пищеварительному тракту.
	17.	Родители обеспокоены наличием постоянного слюнотечения у ребёнка в возрасте 5 месяцев. Какой ответ вы можете дать родителям?
	18.	Почему в нейлоновой рубашке жара переносится значительно тяжелее, чем в хлопчатобумажной?
	19.	У студентов после ответа на экзамене определено содержание глюкозы в крови. По данным биохимического исследования обнаружено повышение содержания глюкозы в крови в пределах допустимых колебаний. Дайте физиологическое обоснование выявленной гипергликемии.
	20.	Пациент не может открыть глаз (так называемый птоз). Одновременно у него наблюдается расходящееся косоглазие. Поражение, какого нерва можно заподозрить?
ПК – 1.4.		Задания открытого типа
Вести медицинскую документацию при	1.	После изучения студентами костей туловища преподаватель поставил перед ними следующую задачу — назвать количество этих костей и распре делить их в соответствии с классификацией костей по группам. Ответ студентов был правильным. Как они его сформулировали?
выполнении лабораторных исследований с учетом профиля лаборатории	2.	Несмотря на наличие в организме более чем двухсот костей, разных по форме и размерам, все они состоят из одинаковых анатомических структур. Как правильно называются эти структуры? На костях предплечья студенты нашли несколько суставных поверхностей. Они постарались их посчитать и выделили самые большие по площади. Каким должен быть правильный ответ при решении данной задачи?
	3.	При рассмотрении рентгенограммы скелета кисти хорошо различимы кости всех ее частей. Как называются рассматриваемые на рентгенограмме отделы и сколько в каждом из них костей?
	4.	После травмы головы нейрохирурги установили нарушение целостности одного из отверстий большого крыла клиновидной кости и наличие в его области кровотечения. Какое отверстие было повреждено, и могло ли это быть причиной кровотечения?
	5.	Преподаватель попросил студентов назвать кость мозгового черепа, которая имеет наибольшее число отростков, отходящих от ее центральной части. Студенты быстро дали правильный ответ. Каким он должен быть?
	6.	У человека при падении была травмирована правая височная сторона головы, что привело к повреждению

7	структур, формирующих височную ямку. Какие костные образования ограничивают височную ямку?
7.	При травмах мозгового отдела черепа всегда есть опасение ранения венозных синусов, что ведет к сильному
	кровотечению. Какие три самые крупные борозды синусов располагаются на внутренней поверхности
	мозгового черепа?
8.	По статистике травматологов, частота вывихов в плечевом суставе самая высокая по сравнению со всеми
	другими суставами. Какие особенности строения этого сустава предопределяют высокую частоту его вывихов?
0	
9.	В пределах ромбовидной ямки проецируются ядра одного из черепных нервов, имеющего наибольшее число
10	чувствительных ядер. Какой это нерв и как называются чувствительные ядра?
10.	Кисть человека в отличие от кисти обезьян может полностью обхватывать предмет. Какая мышца является
	ведущей при выполнении указанного движения?
11.	Греческий герой троянской войны Ахиллес был убит при попадании стрелы в единственно уязвимое место
	героя – его пятку. Сухожилие какой мышцы было названо древними анатомами именем героя и к какому
	костному образованию на стопе оно прикрепляется?
12.	Часто при оперативных вмешательствах на органах брюшной полости хирурги проводят самый бескровный
	разрез в пределах брюшной стенки. В какой области передней брюшной стенки и почему осуществляется
	такой разрез?
13.	Преподаватель спросил студентов о влиянии подкожной мышцы шеи на регионарный кровоток. Ответы были
	противоречивыми. Каким должен быть правильный ответ?
14.	При осмотре зева у больного врач обнаружил воспаление небных миндалин. Где находятся эти миндалины?
15.	У больного с сильным насморком (ринитом) появилась боль в правом ухе. Врач поставил диагноз –
	средний отит (воспаление слизистой оболочки среднего уха). Из какой части глотки и через какое отверстие
	инфекция проникла в полость среднего уха?
16.	На протяжении пищеварительного тракта циркулярный слой гладких мышц образует сфинктеры (жомы). Как
10.	называются эти сфинктеры?
17.	На основе греческих названий желудка, тонкой и толстой кишок формируются названия воспаления их
	слизистых оболочек. Как по-гречески называются эти органы?
18.	Во время операции у больного из желчного пузыря удалили мелкие камни и 75 мл желчи. Соответствует ли
	объем удаленной желчи нормальному объему желчного пузыря?
19.	В травматологический пункт доставлен пострадавший, которому в дыхательные пути попало инородное

		тело. В какой бронх оно попадает с большей вероятностью и почему?
	20.	Известно, что мозговое вещество почки имеет от 10 до 15 почечных пирамид. Однако малых почечных
		чашек насчитывается 8-9. Как объяснить этот факт?
		Задания закрытого типа
	1.	Фильтрационное давление в нефронах почек рассчитывается по формуле: 1) ФД=АД+(ГД-ОД); 2) ФД=ВД-
		$(\Gamma Д + АД); 3) \Phi Д = \Gamma Д - (OД + ВД); 4) \Phi Д = \Gamma Д + (OД + ВПД).$
	2.	Назовите фактор, не влияющий на скорость клубочковой фильтрации: 1) количество действующих
		нефронов; 2) состав форменных элементов крови; 3) фильтрационная поверхность капилляров клубочков;
		4) объем крови, проходящий через почки в единицу времени.
ПК.1.5. Оказывать	3.	Если в сутки образуется 180 л первичной мочи, то за 1 минуту ультрафильтрата образуется: 1) 25 мл.; 2) 18
медицинскую помощь в		мл.; 3) 125 мл.; 4) 1,5 л.
экстренной форме	4.	Какие кости относятся к плоским костям:
		1) кости запястья, предплюсна, сесамовидные кости;
		2) кости крыши черепа, кости образующие грудную и тазовую полость;
		3) позвонки;
		4)фаланги пальцев, лучевая, плечевая, локтевая;
	5.	Какие ребра называют ложными?
		1) ребра, которые заканчиваются в мышцах брюшного пресса;
		2) ребра, которые соединяются с грудиной;
		3) ребра, которые соединяются с хрящом вышележащего ребра;
		4) нет правильного ответа
	6.	Нижний носовой ход сообщается с:
		1) гайморовой пазухой 2) клиновидной пазухой
		3) лобной пазухой
		4) носослезным каналом
	7.	К шаровидному суставу относят:
	'.	1) тазобедренный
		2) лучезапястный
		3) соединение между 1 и 2 шейными позвонками
		4) соединение между позвонками
<u> </u>	1	1 / 11

8.	Медиальную группу мышц бедра составляет мышца:
	1) портняжная
	2) полусухожильная
	3) полуперепончатая
	4) короткая приводящая
9.	1. Дельтовидная бугристость характерна для кости:
	1) плечевой
	2) лучевой
	3) локтевой
	4) бедренной
10.	Язычная артерия проходит в:
	1) сонном треугольнике шеи
	2) лопаточно-ключичном треугольнике шеи
	3) позадинижнечелюстной ямке
	4) треугольнике Пирогова
11.	Какой гормон вырабатывает мозговое вещество надпочечников:
	1) альдостерон
	2) кортизон
	3) адреналин
	4) паратгормон
12.	Что образуют верхушки почечных пирамид?
	1) малые почечные чашечки
	2) почечные сосочки
	3) мочевые канальцы
	4) капсула почки
13.	Участок легочной доли, вентилируемый одним бронхом третьего порядка:
	1) бронхиола
	2) доля
	3) сегмент
	4) ацинус

 14.	Versed Frankling de many versennen versennen
14.	Какая групповая формула молочных зубов человека:
	$1) 2012 \times 2102$
	2012\2102
	2)3212\2123
	3212\2123
	3) 3012/2103
	3012/2103
	4) <u>2021/1202</u>
	2021/1202
15.	Винслово отверстие соединяет брюшинную полость с:
	1) печеночной сумкой
	2) преджелудочной сумкой
	3) сальниковой сумкой
	4) малым сальником
16.	Малый круг кровообращения начинается в:
	1) левом желудочке
	2) левом предсердии
	3) правом предсердии
	4) правом желудочке
17.	От грудной аорты берут начало:
	1) 10 пар задних межреберных артерий
	2) верхняя брыжеечная артерия
	3) нижняя брыжеечная артерия
	4) нижняя диафрагмальная артерия
18.	Артерия, участвующая в кровоснабжении органов малого таза:
	1) бедренная
	2) общая сонная
	3) внутренняя подвздошная
	4) наружная подвздошная
19.	К поверхностной вене нижних конечностей относится:
	1) бедренная
	2) передняя большеберцовая
19.	/ · · · ·

	ı	
		3) задняя большеберцовая
		4) большая подкожная
	20.	Какие стволы образуют правый лимфатический проток?
		1) правый яремный и левый медиостенальный
		2) правый подключичный и правый яремный
		3) левый подключичный и левый яремный
		4) правый и левый бронхосредостенный
$\mathbf{JP} - 1$. Личностные		Задания закрытого типа
результаты реализации	1.	Количество белков в плазме крови равно:
программы воспитания		1) 2 - 3 %;
(например, Осознающий		2) 8 - 10 %;
себя гражданином		3) 6 – 8 %;
России и защитником		4) $10-15\%$.
Отечества, выражающий	2.	Изотонический раствор – это раствор содержащий:
свою российскую		1) определенное количество эритроцитов;
идентичность в		2) количество солей, соответствующее плазме крови;
поликультурном и		3) количество питательных веществ, соответствующее плазме крови;
многоконфессиональном		4) определеное количество белков плазмы крови.
российском обществе и	3.	Гемолизом называется:
современном мировом		1) разрушением эритроцитов;
сообществе. Сознающий		2) разрушением лейкоцитов;
свое единство с народом		3) образованием тромба;
России, с Российским		4) соотношением плазмы и форменных элементов.
государством,	4.	Физиологический раствор это:
демонстрирующий		1) 0,9 % NaCl;
ответственность за		2) 10 % NaCl;
развитие страны.		3) 6 % NaCl;
Проявляющий		4) 0,9 % KCl.
готовность к защите	5.	Белки плазмы крови не выполняют функцию:
Родины, способный		1) защитную;
аргументированно		2) трофическую;

		2)
отстаивать суверенитет		3) транспорт газов;
и достоинство народа)		4) пластическую.
	6	Вязкость крови – это взаимодействие:
		1) эритроцитов с солями плазмы;
		2) клеток крови и белков между собой;
		3) клеток сосудистого эндотелия;
		4) кислот и оснований в плазме крови.
	7.	Ацидоз это:
		1) сдвиг реакции крови в кислую сторону;
		2) сдвиг реакции крови в щелочную сторону;
		3) изменение осмотического давления;
		4) изменение онкотического давление.
	8.	Количество минеральных веществ в плазме крови равно:
		1) 8 – 10 %;
		2) 6 - 8%;
		3) $0.8 - 1\%$;
		4) 0,1-0,3 %.
	9.	Алкалоз – это:
		1) сдвиг реакции крови в кислую сторону;
		2) сдвиг реакции крови в щелочную сторону;
		3) изменение осмотического давления;
		4) изменение онкотического давления.
	10.	Что входит в состав позвонка:
		1) тело, семь отростков;
		2) тело, дуга, позвоночное отверстие, семь отростков;
		3) тело, шейка, головка;
		4) тело, шейка, остистый отросток.
	11.	К какой кости прикрепляется прямая мышца живота?
		1) лонной кости;
		2) подвздошной кости;
		3) седалищной кости;
	1	

	4) бедренная кость.
12.	Что является латеральной стенкой бедренного канала?
	1) большая приводящая мышца
	2) бедренная артерия
	3) бедренная вена
	4) седалищный нерв.
13.	Вторая фасция шеи (по В.Н. Шевкуненко) называется:
	1) предпозвоночная фасция
	2) поверхностная фасция
	3) поверхностный листок собственной фасции шеи
	4) глубокий листок собственной фасции шеи.
14.	К минералокортикоидам относят гормон:
	1) кортизон
	2) альдостерон
	3) прогестерон
	4) паратгормон
15.	Как называется внутренняя оболочка стенки матки.
	1) эндометрий
	2) периметрий
	3) параметрий
	4) миокард
16.	Где находится аппендикс?
	1) правая подвздошная область
	2) левая подвздошная область
	3) правое подреберье
	4) левое подреберье
17.	Какие мышцы относятся к собственным мышцам языка:
	1) нижняя продольная мышца, вертикальная мышца языка
	2) поперечная мышца языка, вертикальная мышца языка

1	
	3) нижняя продольная мышца, верхняя продольная мышца, поперечная мышца языка, вертикальная мышца
	языка
	4) подбородочноязычная мышцы, шилоязычная мышца, подъязычно-язычная мышца
18.	Как покрыта брюшиной слепая кишка?
	1) интраперитонеально
	2) мезоперитонеально
	3) экстраперитонеально
	4) нет правильного ответа
19.	Большой круг кровообращения начинается из:
	1) левого желудочка
	2) левого предсердия
	3) правого предсердия
	4) правого желудочка
20.	Основным водителем ритма сердца является:
	1) волокна Пуркинье
	2) предсердно-желудочковый узел
	3) пучок Гиса
	4) синусно-предсердный узел
	Задания открытого типа
1.	в одном из боёв под Бородино в 1812 году был ранен генерал Тучков. Узнав об этом, фельдмаршал М.И.
	Кутузов послал своего личного врача Малахова оказать помощь раненому, которого уже доставили на
	перевязочный пункт. Малахов тотчас же поспешил к генералу. Но когда врач увидел Тучкова, заметил резкую
	бледность его лица, пощупал его пульс и выслушал сердце, то ему стало ясно, что положение раненого
	безнадёжно. Как выяснилось, хотя рана была относительно небольшой, но осколок гранаты пробил большой
	кровеносный сосуд – наружную подвздошную артерию и вызвал огромное кровотечение. Тучков умирал не
	от самой раны, а от потери крови. Вскоре его жизнь оборвалась.
	Что, по Вашему мнению, мог бы сделать врач Малахов, чтобы спасти
	раненому жизнь?
2.	В клинику ленинградского профессора Ю.Ю. Джанелидзе (1883 -1950) в разное время доставили 20 больных
	с кровоточащими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.
	Чтобы возместить кровопотерю. Всем больным сделали переливание крови. А затем ждали, что будет дальше.
1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

	Потребуется ли вмешательство хирурга для остановки кровотечения? Оперировать пришлось лишь одного.
	У остальных кровотечение больше не возобновлялось. Хотя сама язва, разумеется, не исчезла и требовала
	дальнейшего лечения. Почему прекратилось кровотечение?
3.	У больного моча имеет цвет пива, что обусловлено присутствием большого количества билирубина. С чем
	может быть связано увеличение количества этого пигмента в моче?
4.	Машинист подъёмного крана, 40 лет, 9 месяцев назад перенёс открытую травму левого локтевого сустава с
	развитием длительно текущего нагноительного процесса. Два с половиной месяца лечил амбулаторно, а
	затем был выписан на работу. Однако в последнее время стал отмечать резкое ограничение движений в левом
	локтевом суставе и невозможность пользоваться левой рукой для работы. Что следует предположить у
	больного и какова тактика лечения этого заболевания?
5.	Женщина – пенсионерка, 67 лет, спускаясь по ступенькам лестницы метро станции «Бабушкинская»,
	оступилась и упала на область большого вертела бедренной кости.
	При осмотре дежурным врачом в приёмном отделении больная отмечает боль в области правого
	тазобедренного сустава, нога ротирована (повёрнута) кнаружи, укорочена. Больная не может поднять
	вытянутую ногу (симптом прилипшей пятки), пассивные движения в тазобедренном суставе резко
	болезненны, и ограничены, отмечаются отёк и гематома в области тазобедренного сустава. Ваше мнение о
	диагнозе и лечении.
6.	Ребёнок, 1,5 года, играя в комнате с полиэтиленовым пакетом, нечаянно одел его себе на голову, начал
	задыхаться и через некоторое время потерял сознание. Мать в этот момент была на кухне, почуяв недоброе,
	зашла в комнату и констатировала наличие судорог мышц конечностей, дыхательных мышц, а также
	синюшность губ, ушных раковин, пальцев рук и ног. Что должна предпринять мать немедленно, чтобы
	спасти жизнь ребёнку?
7.	Ученик 8 класса средней школы, 13 лет, через день после сильного переохлаждения почувствовал лёгкое
	недомогание. Ощущение сухости в носоглотке, зуд в носу. На третий день «заложило» нос, появились:
	чихание, слезотечение, нарушение обоняния, обильные жидкие выделения из носа. В дальнейшем выделения
	приобрели слизисто-гнойный характер. При риноскопии отмечается гиперемия, набухание слизистой
	оболочки носа, большое количество слизисто-гнойных выделений из обеих половин полости носа. Ваше
	мнение о диагнозе?
8.	Рабочий цементного завода, 38 лет, отмечает на протяжении последних 7 лет 2-3 месяца в году кашель и
	выделение мокроты (особенно по утрам). Курит с 20 лет примерно по 20 – 25 сигарет в день. В последнее
	время появилась одышка вначале при физической нагрузке, а затем и в покое. При физикальном

'		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		исследовании: перкуторно – ясный легочной звук с коробочным оттенком, аскультативно – рассеянные сухие свистящие хрипы. Кожа цианотична. Рентгенологически определяется усиление и деформация легочного
		рисунка за счёт бронхиальных структур. Ваш предполагаемый диагноз?
	9.	Во время Великой Отечественной войны в ленинградском военно-морском госпитале при обходе ординатором больных в палату влетел и разорвался снаряд. Почти все больные были убиты. Врач при этом
		не посредственно никак не пострадал, так как на минуту зачем-то вышел в коридор. Когда через несколько
		часов после этого у него измерили АД, то оно оказалось значительно повышенным: максимальное достигало
!		220 мм.рт.ст., минимальное 120 мм рт ст. С этого времени АД продолжало оставаться на таком уровне.
		Достоверно известно, что вплоть до описанного случая АД у него было нормальным. Ваше мнение о диагнозе?
	10.	Во время Великой Отечественной войны в ленинградском военно-морском госпитале при обходе
		ординатором больных в палату влетел и разорвался снаряд. Почти все больные были убиты. Врач при этом
		не посредственно никак не пострадал, так как на минуту зачем-то вышел в коридор. Когда через несколько часов после этого у него измерили АД, то оно оказалось значительно повышенным: максимальное достигало
		220 мм.рт.ст., минимальное 120 мм рт ст. С этого времени АД продолжало оставаться на таком уровне.
		Достоверно известно, что вплоть до описанного случая АД у него было нормальным. Ваше мнение о
!		диагнозе?
	11.	Кондитер столовой со стажем работы 15 лет, женщина, 45 лет, рост 165 см, большая любительница сладких
		и мучных блюд, в последние 2 года стала отмечать отложение жира в подкожной клетчатке преимущественно на животе, груди, шее, спине, в области таза, также одышку, быструю утомляемость, боли в области сердца.
		При росте 165 см в течение последних 2 лет масса тела увеличилась от 65 кг до 82 кг.
		Ваше мнение о возможных последствиях этого заболевания.
	12.	Температура воздуха +38°C. На пляже борются с перегреванием разными способами: один лежит,
		свернувшись калачиком, другой находится в воде при той же температуре, третий завернулся в мокрую
!	12	простыню, четвёртый стоит. Какой способ наиболее эффективный?
	13.	Продавец киоска, женщина, 25 лет, через несколько дней после сильного переохлаждения почувствовала общую слабость, повышение температуры тела, тяжесть внизу живота, учащённое болезненное
		мочеиспускание с болью в конце его. При осмотре моча мутная с неприятным запахом и примесью крови.
		Ваше мнение о предполагаемом диагнозе?

14. Спортсмен-лыжник, 25 лет, на следующий день после тренировки на лыжах в морозную ветреную погоду почувствовал озноб и сильные боли в мошонке слева, которые иррадиировали в паховую область. К вечеру температура тела повысилась до 38.5°C. При осмотре мошонка с левой стороны отёчна, гиперемирована. При пальпации придаток левого яичка увеличен, напряжён, уплотнён, болезнен. Придаток как обруч охватывает яичко. Поверхность яичка гладкая, консистенция равномерная, плотноэластическая. В крови — лейкоцитоз (11000 лейкоцитов в 1мкл), повышение СОЭ (до 20 мм/ч). Ваш предварительный диагноз.
15. Проводница вагона пассажирского поезда, 30 лет, не замужем, в прошлом перенесла воспаление яичников и придатков матки, делала 2 аборта. На протяжении последних 2 месяцев отмечает нагрубание и боль в молочных железах, усиливающиеся перед менструациями, иногда выделение из сосков. При осмотре и пальпации на фоне уплотнённой ткани желез определяются более плотные образования, расположенные в верхненаружном квадранте. Прощупываются также слегка увеличенные подмышечные лимфатические узлы, но мягкой консистенции. В середине менструального цикла отмечается уменьшение как болевого синдрома, так и местных изменений в молочных железах. О каком заболевании следует думать в данном случае и что необходимо рекомендовать больной?
16. Учительница средней школы, за лет, год назад перенесла тяжёлую психическую травму — скоропостижную смерть матери от несчастного случая. Вскоре стала отмечать раздражительность, эмоциональную лабильность, плаксивость, чувство давления и неловкости в области шеи. Появились тахикардия, пучеглазие (экзофтальм), блеск глаз, потливость, чувство жара, непереносимость тепла, субфебрильная температура, похудание, снижение трудоспособности и т.д. О каком заболевании следует подумать в первую очередь, на что обратить внимание при диагностике и что необходимо назначить больной для уточнения диагноза? 17. У пациента соринка попала под нижнее веко, вызвав боль и слёзотечение. Функциями, каких нервов можно
объяснить данные симптомы? 18. Больная, 25 лет, работает птичницей на птицефабрике в течение трёх лет. За последние 6 месяцев трижды госпитализировалась в стационар по поводу внезапно появляющихся отёков на открытых участках кожи лица (щёки, губы, веки), кистей рук, на слизистых оболочках полости рта, языка, глотки. Причём язык отекал настолько, что не помещался во рту, при этом глотание и речь были затруднены. Одновременно отекали мягкое нёбо, язычок, нёбные миндалины. Отёки длились до 3-4 суток и сопровождались плохим общим самочувствием (слабостью, ознобом, головной болью). Кожного зуда при этом не наблюдалось. О каком заболевании идёт речь в данном случае?

19	Мальчик, 13 лет, ученик 7 класса средней школы, в течение двух недель амбулаторно лечился по поводу
	простого блефарита – воспаления краёв век. Заболевание протекало относительно легко, больной отмечал
	небольшой зуд и ощущение засорённости в глазах. Но через 2 дня после сильного переохлаждения у
	больного на ограниченном участке вблизи края верхнего века правого глаза появилось покраснение с
	болезненной припухлостью. На третий день болезни в области припухлости образовалась жёлтая
	«головка», после вскрытия, которой стал выделяться гной и кусочки некротизированной ткани. После этого
	болезненность постепенно уменьшилась, воспалительные явления стихли, но проявление блефарита в виде
	покраснения краёв век ещё остались. Какое заболевание возникло у мальчика на фоне воспаления краёв
	век?